

午膳食品分類表

使用指引

建議校內的膳食小組或負責學童膳食的老師，在收到由午膳供應商提供的餐單後，參考以下步驟進行審批，並與供應商溝通改良餐單，令學生的午膳更健康。

步驟：

一、 去除「紅燈」食品

應剔除餐單內所有「強烈不鼓勵供應的食品」，確保所有餐款沒有供應此類「紅燈」食品。分類詳情請參閱《學生午膳營養指引》第 13 頁。

較容易被忽略的「紅燈」食品包括：

- 芡汁（例如以椰漿或椰汁製成的咖喱／葡汁、以忌廉製成的白汁）
- 預先經過油炸處理的食品（例如魚腐、伊麵、經油炸處理的枝竹）
- 含反式脂肪的食品（例如酥皮麵包）

二、 留意一週內「黃燈」食品的出現次數

找出「限制供應的食品」，並確保每週不多於兩天供應此類「黃燈」食品。有關此類食品的分類詳情，請參閱《學生午膳營養指引》第 12 頁。

三、 核實「綠燈」食品的出現次數

視乎學校午膳提供穀物類的情況，

- 如每天供應一款以上的穀物類，則每天須在最少一款午膳款式中提供「鼓勵多供應的食品」（「綠燈」食品）；
- 如每天只供應一款穀物類，則每週須在最少兩個上課天提供「鼓勵多供應的食品」。

有關此類食品的分類詳情，請參閱《學生午膳營養指引》第 11 頁。

類別	準則	食物例子
<p>鼓勵多供應的食品¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 如每天供應一款以上的穀物類，須<u>每天在最少一款午膳款式中提供此類食品</u>； ➢ 如每天只供應一款穀物類，須<u>每週最少兩個上課天</u>向學生提供此類食品 	<ul style="list-style-type: none"> ● 穀物類食品須含最少 10% 的全穀麥或添加蔬菜，但不包括薯仔、番薯、果仁和種籽（如亞麻籽、芝麻） 	<p>紅米飯、糙米飯、菜飯、粟米飯、蘑菇飯、甘筍飯、南瓜飯、薏米飯、五穀飯、麥包、蕎麥麵、菠菜麵、三色螺絲粉、藜麥</p>
<p>限制供應的食品</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>每週（四或五個上課天）不多於兩個上課天</u>向學生供應此類食品； ➢ 如一週只有兩至三個上課天，<u>便不應多於一天供應</u>； ➢ 如一週只得一個上課天，<u>便不應供應</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 添加了脂肪、油分的穀物類 ● 脂肪比例較高的肉類及連皮的禽肉 ● 全脂奶品類 ● 加工或醃製的肉類、蛋類及蔬菜類食品 ● 高糖分、高鹽分或高脂肪醬汁或芡汁³ 	<p>炒飯²、炒麵²、油麵、薄餅（不以「紅燈」食品作食材）</p> <p>牛腩、牛肋骨、排骨、豬頸肉、豬軟骨、連皮的雞、鴨和鵝（如雞翼、雞髀、雞槌，但雞腳除外⁵）</p> <p>全脂奶、全脂芝士、全脂乳酪、各種淡奶（包括較低脂淡奶）</p> <p>玉子豆腐、叉燒、煙肉、鴨胸肉、火腿、香腸、午餐肉、牛丸、白魚蛋、貢丸、雪菜、榨菜、豆豉、素肉、蟹柳、五香豆乾、現成點心（例如燒賣、菜肉包、牛肉球、潮州粉果）、油浸罐頭吞拿魚、罐頭湯、獅子狗卷、滷水蛋、現成豬柳漢堡扒、鹽焗雞</p> <p>芡汁或醬料：豉汁、照燒汁、瑞士汁、茄汁(Ketchup)、白汁或卡邦尼汁（以全脂奶或各種淡奶製成）、葡汁或咖喱（以全脂奶或各種淡奶製成）、滷水汁、南乳、腐乳、麵醬、馬拉盞、蝦醬、柱候醬、豉油皇、梅子、味噌、豆瓣醬、燒烤汁、沙嗲、沙茶醬、甜酸汁、炸醬</p>
<p>強烈不鼓勵供應的食品</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>所有午膳款式不應提供此類食品</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 油炸食物 ● 添加了動物脂肪或植物性飽和脂肪 ● 添加反式脂肪的食物 ● 「少選為佳」的飲品⁴ ● 鹽分極高的食品 	<p>炸豬扒、炸薯條、炸雞髀、春卷、咖喱角、豆卜、炸魚蛋、炸麵筋、炸枝竹、炸魚柳、炸魚腐、炸花生、伊麵、含油條的食物（如油條案飯）、紅燒豆腐、炸雞腳⁵</p> <p>食油：牛油（包括較低脂牛油）、豬油、忌廉（包括較低脂忌廉）、棕櫚油、椰子油 食物：菠蘿油、菠蘿包、雞尾包、椰檳、酥皮蛋撻、蛋撻、曲奇、蛋卷、夾心餅、牛角包、牛油餐包（額外添加牛油）、其他以椰漿/椰汁製成的食物、鬆餅（scone 和 muffin） 芡汁：白汁或卡邦尼汁（以忌廉製成）、葡汁或咖喱汁或沙嗲醬（以椰漿/椰汁製成）</p> <p>添加了以下食油的食物：氫化植物油、含反式脂肪的植物牛油和起酥油</p> <p>汽水、果味飲品、加糖果汁、乳酪飲品、乳酸菌飲品、紙包檸檬茶或菊花茶或中式涼茶、運動飲品、綠茶</p> <p>鹹魚、鹹蛋、臘腸、臘肉、含臘味的食品（如糯米雞、蘿蔔糕、芋頭糕）、金華火腿</p>

1. 由於學童的發育及成長需要大量鈣質，午膳供應商宜多以鈣質豐富的食物為材料。可是，由於適合製作午膳餐盒的鈣質豐富食材有限，家長應多為子女於午膳以外的時段供應鈣質豐富的食物。

2. 指在烹煮過程中添加多於兩茶匙油（一人分量計）的飯及麵類食品。

3. 建議減少加入高糖分、高鹽分或高脂肪醬汁或芡汁，並把醬汁或芡汁分開供應。

4. 請參考《學生小食營養指引》內「少選為佳」的飲品例子。

5. 雞腳無論油炸與否，均屬「強烈不鼓勵供應的食品」，因其主要營養成分為脂肪。